



Association de la crèche Barbotine

Annexe 4

Éviction lors de maladies

Maladies transmissibles nécessitant une éviction de l'enfant de la crèche :

La varicelle : La maladie se manifeste par une éruption cutanée qui commence souvent sur la tête puis qui se propage sur tout le corps. Ces petits boutons (vésicules) vont se dessécher et former des croûtes. Certains enfants n'ont que quelques vésicules, d'autres en sont recouverts de la tête aux pieds et peuvent avoir de la fièvre. Accueil en crèche dès que l'état général de l'enfant le permet et que toutes vésicules soient sèches, car tant que les vésicules sont purulentes l'enfant est contagieux.

Le syndrome pied-main-bouche : Il se caractérise par des maux de gorges dûs aux aphtes, une légère fièvre et l'apparition de petits boutons, autour de la bouche, sur les mains, sur les pieds et ailleurs sur le corps. Accueil en crèche dès que l'état général de l'enfant le permet.

Le parvovirus ou cinquième maladie : Ce virus se caractérise par des joues très rouges, une éruption cutanée, et parfois, peut être accompagné d'une légère fièvre. **Ce virus est très dangereux pour les femmes enceintes.** Accueil en crèche dès que l'état général de l'enfant le permet.

La roséole infantile ou sixième maladie : Elle est aussi nommée fièvre des trois jours. Elle se caractérise par une forte fièvre et des boutons sur le visage et le tronc. Accueil en crèche dès que l'état général de l'enfant le permet.

La bronchite, la bronchiolite : La bronchite est une inflammation des voies respiratoires inférieures, les bronches. Elle se manifeste par de la toux et éventuellement de la fièvre. L'enfant a une respiration sifflante et peut se retrouver en détresse respiratoire. Accueil en crèche dès que l'état général de l'enfant le permet.

La bronchiolite est une inflammation des petites bronches (bronchioles). Elle se caractérise par une toux accompagnée d'une respiration sifflante, d'une respiration rapide ou d'un serrement près des côtes. L'enfant peut aussi présenter

des symptômes de rhume et une légère fièvre. Accueil en crèche dès que l'état général de l'enfant le permet. **Néanmoins, la bronchiolite est contagieuse et peut être très dangereuse pour les nourrissons de moins de six mois.**

L'angine : L'angine est une inflammation qui touche la gorge et les amygdales. Elle peut être d'origine virale ou bactérienne, et est souvent accompagnée de symptômes grippaux et de fièvre. Lors d'angine virale, accueil en crèche dès que l'état général de l'enfant le permet. **Néanmoins, lors d'angine streptocoque, retour possible après 48 heures de traitement antibiotique, et si l'état de l'enfant le permet.**

La conjonctivite : Elle se caractérise par une inflammation de l'œil accompagnée de sécrétions purulentes. Elle peut être virale, bactérienne ou allergique. Retour possible en crèche après 24 heures de traitement (collyre = gouttes pour les yeux).

La gastro-entérite : Cette maladie, souvent nommée grippe intestinale, est une inflammation de l'estomac et des intestins. Fortement contagieuse, elle est caractérisée par des vomissements, des diarrhées et peut être accompagnée de fièvre. L'enfant perd beaucoup de liquide, c'est pourquoi, il est important de bien réhydrater régulièrement l'enfant. Retour possible en crèche 24 heures après l'arrêt des symptômes principaux (vomissements et diarrhée) et si l'état général de l'enfant le permet. Lors de forte épidémie, retour possible 48 heures après l'arrêt des symptômes principaux.

Les poux de tête : L'enfant ressent des démangeaisons de la tête. On peut constater la présence de lentes à la racine des cheveux. Les lentes ressemblent à des pellicules mais sont difficiles à enlever. Le pou passe de tête en tête par contact direct. Retour en crèche possible après traitement et pour autant qu'il n'y ait plus de poux ou lentes.

Web :

Vous trouvez les règlements de la crèche ainsi que différentes informations sur le site internet : www.creche-barbotine.ch